




Prevalencia del consumo de cigarrillos en México (2009)¹³



Prevalencia del consumo de cigarrillos entre los jóvenes (de entre 13 y 15 años de edad) en la Ciudad de México (2006)¹⁴



Prevalencia del consumo de cigarrillos según el nivel de educación y la ubicación del hogar en México (2002)¹⁵



CONSUMO DE TABACO

- En México, aproximadamente 16% de la población (10,9 millones) son fumadores actuales.¹
- 25% de los hombres y 8% de las mujeres fuman.²
- Entre los jóvenes (de entre 13 y 15 años) de la Ciudad de México, más del 27% fuman cigarrillos con una leve diferencia entre los sexos (varones 26%; mujeres 27%).³
- En 2007, se vendieron más de 48 mil millones de cigarrillos en México.⁴

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD

El consumo de tabaco es mortal. Fumar mata hasta la mitad de todos los consumidores de por vida.⁵

- Por año, mueren 60.000 mexicanos como consecuencia de una enfermedad relacionada con el tabaco.⁶
- El 10% de todas las muertes que se producen en México se atribuyen al consumo de tabaco.⁷
- Por año, aproximadamente 100.000 pacientes solicitan servicios de atención médica para tratar enfermedades relacionadas con el tabaco.⁸
- En la Ciudad de México, el 60% de los jóvenes (de entre 13 y 15 años) se encuentran expuestos al humo de segunda mano en los lugares públicos, mientras que el 46% de los jóvenes se encuentran expuestos al humo de segunda mano en el hogar.⁹
- 20% de los adultos están expuestos al humo de tabaco ajeno en su lugar de trabajo y 17% de los adultos están expuestos al humo de tabaco en sus hogares.¹⁰

COSTOS PARA LA SOCIEDAD

El tabaco se cobra un alto precio en la sociedad.

- En 2008, los costos de atención médica relacionados con las enfermedades por tabaquismo en México se estimaron en 75,2 mil millones de pesos (5,7 mil millones de dólares estadounidenses). Dicha estimación supone que los costos relacionados con los tratamientos por tabaquismo representan el 10% de la totalidad de los costos de atención médica.¹¹
- La pérdida de oportunidades económicas en los países en vías de desarrollo con alta densidad es grave porque la mitad de todas las muertes relacionadas con el tabaco ocurren durante los principales años de productividad (de 30 a 69 años).¹²
- Fumar también genera costos en relación con los daños por incendios y daños al medio ambiente mediante la fabricación y el empaquetado de los productos de tabaco.

1-2. Global adult tobacco survey (GATS): Mexico. World Health Organization; 2010. 3. CDC Global Youth Tobacco Survey (GYTS) [base de datos en el Internet]. Mexico – Mexico City 2006. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention. c2009 [citado Marzo 2010]. Disponible en http://apps.nccd.cdc.gov/OSH_GTSS/default/Default.aspx. 4. Euromonitor International [base de datos en el Internet]. London: Euromonitor; c2009 [revisado en Octubre 2008; citado en Marzo 2009]. Country Reports: Tobacco-Mexico. Disponible en: Euromonitor International. 5. Mackay J, Eriksen M, Shafey O. The Tobacco Atlas. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 2006. 6. Secretaría de Salud, Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), Instituto Nacional de Psiquiatría, Epidemiología, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Cuarta Encuesta Nacional de Adicciones 2002. Tabaco, alcohol y otra drogas. Resumen Ejecutivo. México: CONADIC; 2003. www.conadic.salud.gob.mx/publicaciones/pubesp.html. 7. CONADIC, 2003. www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/infmed.pdf. 8. Arredondo A, Carrillo C, Zuniga A. Economic burden of expected epidemiological changes in diseases related to tobacco. Rev Saúde Publica. 2007; 41(4):523-9. 9. CDC GYTS, 2009. 10. GATS, 2010. 11. Waters H, Sáenz de Miera B, Ross H, Reynales Shigematsu LM. The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Mexico. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2010. 12. Mackay et al, 2006. 13. Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2006. www.insp.mx/ensanut. 14. CDC GYTS, 2009. 15. Juarez B, Ruiz JA, Shigematsu LM. The Economics of Tobacco in Mexico. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2007. www.insp.mx/ensanut/.